



จะอย่างไรหากถูกสุนัข
หรือแมวที่สงสัยว่าเป็น
โรคพิษสุนัขบ้ากัด



1 รับล้างบริเวณ
แผลด้วย สบู่
“กันที”



2 รับไปพบแพทย์
เพื่อการวินิจฉัยและฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคให้ทันที



3 รับกักสัตว์
เพื่อเฝ้าระวัง
และติดตามอาการ

ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
และไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง

การเก็บรักษาวัคซีน



วัคซีนจะต้องเก็บรักษา
ในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส



ไม่นำวัคซีนไปแช่ในช่องแช่แข็ง
หรือช่องใต้ช่องแช่แข็ง และไม่นำ
วัคซีนมาวางทิ้งไว้จนอุณหภูมิเย็น



หลีกเลี่ยงไม่ให้วัคซีนสัมผัสกับแสงแดด



กรณีนำวัคซีนไปใช้ให้บรรจุลงในกล่อง
รักษาความเย็นหรือกระเป๋าวัดเย็น
ที่สามารถรักษาความเย็นให้อยู่ในระดับ
2-8 องศาเซลเซียส

วัคซีนจะต้องไม่สัมผัสกับน้ำแข็ง
โดยตรง ต้องนำไปใส่ถุงพลาสติก
หรือภาชนะบรรจุที่ป้องกันการสัมผัส
น้ำโดยตรงก่อนบรรจุลงในกล่อง
รักษาความเย็น



งานสัตวแพทย์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-358292



รักน้องหมา
อย่าลืมพาน้องไป **ฉีดวัคซีน**
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า **นะจ๊ะ**



โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากอะไร?

โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัส
ที่ชื่อว่าเรบีสไวรัส (Rabies virus)

สัตว์ชนิดใดที่สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้บ้าง?

สัตว์ที่สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้
คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ซึ่งใน
ประเทศไทยพบการเกิดโรคในสุนัข
มากที่สุด

โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อจาก ทางไหนได้บ้าง?

เชื้อไวรัสออกมากับน้ำลายสัตว์ที่ติดเชื้อ
ส่วนใหญ่จะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัดหรือ
่วน หรือเข้าทางเยื่อตา ปาก จมูก ที่มีแผลหรือ
รอยฉีกขาดได้ ซึ่งสุนัขหรือแมวสามารถแพร่เชื้อ
ผ่านทางน้ำลายได้ 1-7 วัน ก่อนแสดงอาการป่วย

เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อเชื้อ เข้าสู่ร่างกายของคนแล้วจะเกิด อาการภายในกี่วัน?



ไม่แน่นอน ระยะเวลาการเกิดโรค
ขึ้นอยู่กับบริเวณที่โดนกัดว่าใกล้เส้น
ประสาทและสมองมากน้อยเพียงใด

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้ว รักษาหายได้หรือไม่?



โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ไม่สามารถ
รักษาให้หายได้ หากเป็นแล้วจะเสียชีวิต
เท่านั้น สิ่งที่เรามาสามารถทำได้คือ
การป้องกันโรคโดยการฉีดวัคซีน



สุนัขต้องได้รับการฉีด วัคซีน ครั้งแรกที่อายุ 3 เดือน
เข็มที่สองฉีดหลังจากเข็มแรก 3 เดือน
และหลังจากนั้นฉีดกระตุ้นซ้ำเป็นประจำทุกปี



อาการของสุนัขหรือแมวที่เป็น โรคพิษสุนัขบ้าเป็นอย่างไร?

อาการโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
มีแสดงอาการออกมาทั้งแบบ
ดุร้ายและแบบซึม ซึ่งแบบดุร้าย
จะสามารถสังเกตอาการได้ชัด
คือ สัตว์จะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ดุร้ายมากขึ้น
สัตว์ที่โดยปกติจะชอบคลุกคลีกับคนก็จะเปลี่ยน
พฤติกรรมเป็นแยกตัวออกห่าง ชอบอยู่ในที่
เงียบ ๆ แสดงอาการทางระบบประสาท
กระวนกระวาย กัดแทะสิ่งของ กัดทุกสิ่งไม่
เลือกหน้า คางห้อยตก ล้มมีสีแดงคล้ำห้อยออก
นอกปาก

โรคพิษสุนัขบ้าพบเฉพาะ หน้าร้อนใช่หรือไม่?



ไม่ใช่โรคพิษสุนัขบ้าสามารถ
พบได้ ตลอดทั้งปี



พบเห็นสุนัขต้องสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า
แจ้ง งานสัตว์แพทย์ เทศบาลนครนครราชสีมา
โทร: 075-358292